

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: Maxforce White IC csótányirtó gél (Maxforce adagoló pisztolyhoz)

2. Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország)

3. Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Közegészségügyi Üzletág,
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

4. Engedély száma: JÜ-2619-4/2014.

5. Minősítése: III. forgalmi kategóriájú szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 2,15 % imidakloprid

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Fehér színű, képlékeny, műanyag tubusba töltött paszta, mely hatását a rovarokra gyomorméregként fejti ki.

8. Csomagolás:

30 gramm töltőtömeggel műanyag tubusban (4 tubus/karton doboz) kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben csótányok irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

A készítmény kizárólag a Maxforce adagoló pisztollyal juttatható ki a következő módon:

1. Vegyük le a tubusról a védősapkát.
2. Tegyük be a pisztolyba a fémlemez benyomásával az adagolást biztosító műanyag sínt.
3. Helyezzük a tubust a pisztoly végébe.
4. A tubusról vegyük le a védősapkát és tegyük rá az adagolófejet.
5. Ezt követően a ravaszt óvatosan nyomjuk meg mindaddig, amíg a gél az adagolófejen megjelenik.
6. A munka befejezésekor a vezető sínt a fémlap segítségével húzzuk hátra és a tubust a pisztolyból vegyük ki, majd az elejére a védősapkát helyezzük vissza.

Adagolási mennyisége a csótányfajtól és a fertőzöttség mértékétől függ. A gél kb. 5 mm (0,1 g) átmérőjű cseppek formájában juttassuk ki a következő mennyiségekben:

- kis mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 1 csepp/m² vagy folyóméter,
- nagy mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 2 csepp/m² vagy folyóméter,
- kis mérvű konyhai és amerikai csótányfertőzöttség esetén: 2 csepp/m² vagy folyóméter,
- nagy mérvű konyhai és amerikai csótányfertőzöttség esetén: 3 csepp/m² vagy folyóméter.

A gél fénytől védett, tiszta, a csótányok által látogatott helyekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, a vezetékek, szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk ki. Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol az vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.

A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük.

A kijuttatott csalétek 4-5 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.

A kijuttatott gélre, illetve környékére rovarirtószert ne permetezzünk, mert az a csótányokat elriasztja.

A felületekről a gél 5 %-os konyhasó oldattal távolítható el.

12. Figyelmeztetés:

Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos! Használata után bő, meleg szappanos vízzel kezét kell mosni.

A készítmény használatakor a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani.

13. Címkefelirat:

13.1. A gyűjtőcsomagolás dobozán

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10., 11. és 12.pontokat.

13.2. A csótányirtó gél tubusán egyedileg fel kell tüntetni:

Maxforce White IC csótányirtó gél (Maxforce adagoló pisztolyhoz)

Hatóanyaga: 2,15 % imidakloprid *Gyártja:* Bayer SAS (Franciaország)

Forgalomba hozza: Bayer Hungaria Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/8/2014. DDO